СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
К.А. САВЕНКОВ
17 ИЮЛ 2025

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ

(организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Эндокринные технологии»
(ООО «Эндокринные технологии»), Россия
119034, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, пер.
Турчанинов, д. 6, стр. 2, помещ. 1/2)

Номер регистрационного удостоверения:
77-3-13.25-5351/ПВР-3-13.25/04084

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ.

международное непатентованное наименование: хорионический гонадотропин человеческий.

2. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.

1 флакон с лиофилизатом содержит действующее вещество: хорионический гонадотропин человеческий (ХГЧ) – 1500 МЕ, в качестве вспомогательных веществ – маннитол, динатрия фосфата дигидрат, натрия дигидрофосфат дигидрат.

Растворитель содержит: динатрия фосфата дигидрат, натрия дигидрофосфат дигидрат, воду для инъекций.

3. По внешнему виду лекарственный препарат ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ представляет белый или почти белый лиофилизированный порошок или пористую массу, растворитель – прозрачный бесцветный раствор.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. После растворения хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С, использовать в течение 24 часов. Срок годности растворителя – 2 года с даты производства.

Запрещается применять лекарственный препарат после истечения срока годности.

4. По 1500 МЕ во флаконы из бесцветного стекла, укупоренные пробками резиновыми и обкатанные колпачками алюминиевыми.

По 5 мл растворителя во флаконы из бесцветного стекла, укупоренные пробками резиновыми и обкатанные колпачками алюминиевыми

На каждый флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся.

По 1 флакону с лиофилизатом и 1 флакону с растворителем вместе с инструкцией по ветеринарному применению помещают в пачку из картона.

По 2 флакона с лиофилизатом и 2 флакона с растворителем вместе с инструкцией по ветеринарному применению помещают в пачку из картона.

По 5 флаконов помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и гибкой упаковки на основе фольги алюминиевой, или без фольги.

По 2 контурных ячейковых упаковки (с фольгой или без фольги), 1 с лиофилизатом (препаратом) и 1 с растворителем, вместе с инструкцией по ветеринарному применению помещают в пачку из картона.

5. ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

6. ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: по рецепту ветеринарного специалиста.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10. *Фармакодинамические свойства*

ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ представляет лиофилизированную форму хорионического гонадропина человека. ХГЧ – крупный гликопротеин, состоящий из двух нековалентно связанных альфа- и бета- субъединиц.

ХГЧ ускоряет созревание фолликула, стимулируя выработку андрогенов клетками теки и вызывает овуляцию доминантного фолликула. Благодаря

длительному периоду полувыведения он также стимулирует образование и функцию желтого тела.

У самцов стимулирует выработку тестостерона, тем самым влияя на развитие и сохранение первичных и вторичных половых признаков.

Фармакокинетические свойства

После внутримышечного или внутривенного введения препарат быстро всасывается. Благодаря высокой биодоступности, максимальная концентрация ХГЧ в плазме крови животных достигается через 8 часов после внутримышечного введения. Пиковая концентрация ХГЧ (0,05 МЕ/мл) в плазме крови коров достигается через 45 минут после в/в введения в дозе 3000 МЕ.

Период полувыведения из организма составляет 10 часов у коров и 27 часов у свиней.

ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Препарат применяют крупному рогатому скоту, свиньям, лошадям и собакам при следующих нарушениях воспроизводительной функции: многократные нерезультативные осеменения у коров и телок; кисты яичников у коров и телок; анэструс у кобыл и сук; задержка овуляции и затяжной проэструс у сук; снижение либидо у кобелей; для стимуляции овуляции у кобыл и сук; а также для стимуляции и синхронизации овуляции у свиноматок и ремонтных свинок.

12. Запрещается применять ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ при повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата.

13. При работе с препаратом ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками следует немедленно промыть их большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно

обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Запрещается применять лекарственный препарат ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ на сроке беременности более 2-х недель. Применение препарата ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ разрешено в течение первых 2-х недель беременности, а также лактирующим животным.

15. Перед применением содержимое флакона растворяют из расчета 1500 МЕ на 5 мл растворителя до полного растворения лиофилизата. Полученный раствор вводят внутримышечно или внутривенно, соблюдая правила асептики.

Доза и способ введения зависят от вида животного и показаний к применению и приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Вид животных	**Показания к применению**	**Доза**	**Способ введения**
Коровы, телки	Для стимуляции овуляции, повышения оплодотворяемости (многократные нерезультативные осеменения)	1500 МЕ однократно, во время искусственного или естественного осеменения	Внутримышечно или внутривенно
	Лечение фолликулярных кист яичников, анэструс, затяжная охота, нимфомания	3000 МЕ, однократно	Внутривенно
	Стимуляция лютеиновой функции	1500 МЕ через 12 дней после искусственного или естественного осеменения	Внутримышечно
Кобылы	Анэструс (фолликулы > 2 см в диаметре)	1500-3000 МЕ, однократно, при необходимости вводят повторно через 2 дня	Внутримышечно или внутривенно
	Стимуляция овуляции	1500-3000 МЕ, однократно, за 24 часа до искусственного или естественного осеменения	Внутримышечно или внутривенно

Свиноматки, ремонтные свинки	Стимуляция и синхронизация овуляции	500 МЕ, однократно, за 24 часа до или в момент случки	Внутримышечно
Суки	Анэструс	500 МЕ, однократно в первый день эструса, рекомендуется после предварительного введения гонадотропина сыворотки жеребой кобылы в дозе 20 МЕ/кг ежедневно подкожно в течение 10 дней	Внутримышечно или внутривенно
	Запоздалая овуляция, затяжная течка	100-800 МЕ, один раз в сутки, до прекращения истечений из влагалища. Вязка при поведенческом эструсе	Внутримышечно
Кобели	Крипторхизм (перед кастрацией)	100-500 МЕ, 2 раза в неделю, в течение 6 недель	Внутримышечно
	Снижение либидо	100-500 МЕ 2 раза в неделю до 6 недель. Если невозможно - 100-500 МЕ однократно, за 6-12 часов до вязки (может дать временный эффект)	Внутримышечно

16. При применении лекарственного препарата ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ в редких случаях возможны реакции анафилактического типа. В этих случаях рекомендуется немедленное введение адреналина (1:1000) внутривенно или внутримышечно. Также может быть показано введение кортикостероидов.

17. Симптомов передозировки при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией не установлено. Специфического лечения или антидота нет.

18. Информация об особенностях применения препарата ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ с лекарственными препаратами других фармакологических групп отсутствует.

19. Особенностей действия при первом применении препарата и его отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушения применения лекарственного препарата, поскольку это может привести к снижению терапевтической эффективности лечения.

21. Мясо, продукты убоя после применения лекарственного препарата ГОНАХОРИЛ®-ВЕТ можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25, стр.1, 2.
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25, стр. 1

Директор
ООО «Эндокринные технологии» С.А. Косарев