ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ

(организация-разработчик: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Московский эндокринный завод»
(ФГУП «ЭНДОФАРМ»), Россия
109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский,
ул. Новохохловская, д. 25, стр. 1)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-14.26-5583№ПВР-3-14.26/04204

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ.
международное непатентованное наименование: левофлоксацин.

2. Лекарственная форма: капли глазные.

Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ содержит в 1 мл в качестве действующего вещества левофлоксацина гемигидрат – 5,12 мг (в пересчете на левофлоксацин – 5 мг), в качестве вспомогательных веществ – бензетония хлорид, натрия хлорид, хлороводородной кислоты 1 М раствор или натрия гидроксида 1 М раствор, воду для инъекций.

3. По внешнему виду лекарственный препарат Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ представляет собой прозрачную светло-желтую или светло-зеленовато-желтую жидкость.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства, после первого вскрытия не более 30 суток. Запрещается применять лекарственный препарат после истечения срока годности.

4. Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ, капли глазные, 5 мг/мл выпускают расфасованным по 5 мл во флаконы-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давления с навинчиваемыми крышками или колпачками полимерными. 1 флакон-капельницу вместе с инструкцией по ветеринарному применению помещают в пачку из картона.

5. Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ следует хранить в оригинальной упаковке (флакон-капельница в пачке) при температуре не выше 25 °С, отдельно от пищевых продуктов и кормов.

6. Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: по рецепту ветеринарного специалиста.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: производные нафтиридина, хинолоны, фторхинолоны.

10. Левофлоксацин – это L-изомер рацемической лекарственной субстанции офлоксацина. Как антибактериальный препарат класса фторхинолонов, левофлоксацин блокирует ДНК-гиразу (топоизомеразу II) и топоизомеразу IV, нарушает суперспирализацию и сшивку разрывов ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), подавляет синтез ДНК, вызывает глубокие морфологические изменения в цитоплазме, клеточной стенке и мембранах.

Чувствительные микроорганизмы:

• Аэробные грамположительные микроорганизмы – *Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.*;

• Аэробные грамотрицательные микроорганизмы – *Acinetobacter spp., Citrobacter freundii, Eikenella corrodens, Enterobacter spp., Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Helicobacter pylori, Klebsiella spp., Moraxella catarrhalis* (продуцирующие и непродуцирующие бета-лактамазу штаммы), *Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella spp., Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., Serratia spp.*;

• Анаэробные микроорганизмы – *Bacteroides fragilis, Bifidobacterium spp., Clostridium perfringens, Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp., Veilonella spp.*;

• Другие микроорганизмы – *Bartonella spp., Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Legionella spp., Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia spp., Ureaplasma urealyticum*.

При местном применении лекарственного препарата системная абсорбция действующего вещества низкая.

Лекарственный препарат Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ капли глазные применяют собакам и кошкам при следующих офтальмологических показаниях:

- с целью снижения риска развития глазных инфекций после травм и попадания инородных тел, а также при офтальмологических операциях в предоперационный и послеоперационный периоды;

- для лечения поверхностных бактериальных инфекций глаз, вызванных чувствительными микроорганизмами.

12. Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ противопоказано применять у животных с индивидуальной повышенной чувствительностью к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. При работе с препаратом Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками следует немедленно промыть их большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения лекарственного препарата животным во время беременности и лактации, а также потомству животных в возрасте до 1 года определяет ветеринарный врач на основании оценки соотношения потенциальной пользы к возможному риску от его применения.

15. Лекарственный препарат Левофлоксацин-ЭНДОФАРМ применяют местно, в виде инстилляций (закапываний) в конъюнктивальную полость. При необходимости, перед применением препарата следует провести гигиеническую обработку, очищая область вокруг глаз.

По 1-2 капле в пораженный(ые) глаз(а) каждые 2 часа до 8 раз в сутки в течение первых 2 дней, затем 4 раза в сутки с 3 по 5 дни лечения.

Длительность курса лечения определяется тяжестью состояния, его клиническими и бактериологическими особенностями. Средняя продолжительность курса терапии составляет 5 дней.

При применении нескольких офтальмологических лекарственных препаратов интервал между их инстилляциями должен составлять не менее 15 минут.

16. Побочных явлений и осложнений у животных при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование препарата следует прекратить и провести симптоматическую терапию.

17. В случае местного применения избыточной дозы препарата глаз следует промыть чистой водой комнатной температуры.

18. Сведения о взаимодействии лекарственного препарата с другими препаратами, применяемыми в ветеринарии, отсутствуют. В случае использования с другими местными офтальмологическими препаратами интервал между их применением должен составлять не менее 15 минут.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений режима дозирования препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата его следует применить как можно быстрее в той же дозе и по той же схеме.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25, стр.1, 2
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Новохохловская, д. 25, стр.1.